

# 혈관외과 혈관색전술 치료 계획표

PL\_0318\_H1\_202406

구분	입원일	시술일		시술 후 1일(퇴원)
		시술 전	시술 후	
관찰 및 측정	<div><div>■ 활력징후 측정</div><div>■ 체중 측정</div><div>■ 혈당체크(당뇨환자)</div></div> <div></div>	<div><div>■ 활력징후 측정</div><div>■ 체중 측정</div><div>■ 감각, 운동, 순환 사정</div><div>■ 혈당체크(당뇨환자)</div></div> <div></div>	<div><div>■ 활력징후 측정, 맥박 확인(족부 동맥)</div><div>■ 감각, 운동, 순환 사정</div><div>■ 섭취량 및 배설량 측정</div><div>■ 혈당체크(당뇨환자)</div></div> <div></div>	<div><div>■ 활력징후 측정</div><div>■ 감각, 운동, 순환 사정</div><div>■ 혈당체크(당뇨환자)</div></div> <div></div>
활동 정도	일상생활 <div></div>	일상생활 <div></div>	침상 내 절대안정(시술직후 6시간) 침상안정(보행 가능) <div></div>	일상생활 <div></div>
식사	일반식 밥 <div></div>	금식(물 포함) →오전 시술은 자정부터 금식(물포함) 오후 시술은 조식 절반 섭취 후 금식(물포함) <div></div>	■ 수술 직후 침상 안정(4~6시간) 동안 섭취 불가 ■ 침상 안정 이후 의식 명료 시 물 소량 섭취 후 식이 진행 가능	일반식 밥 <div></div>
검사 및 처치	제모(양쪽 서혜부)	필요시 소변줄 삽입	<div><div>■ 혈액검사</div><div>■ 의사 확인 후 소변줄 제거</div></div> <div></div>	
약물 치료		<div><div>[주사]</div><div>- 수액</div><div>- 항생제</div><div>- 위보호제</div><div>- 진통제(시술 가기 전)</div></div> <div></div>	<div><div>[주사]</div><div>- 수액</div><div>- 위보호제</div><div>- 진통제(필요 시)</div></div> <div></div>	<div><div>[주사]</div><div>- 진통제(필요 시)</div></div>
교육 및 설명	<div><div>■ 입원생활 안내</div><div>■ 시술 전 주의사항 교육</div><div>■ 시술동의서 작성</div></div> <div></div>	<div><div>■ 속옷, 틀니, 장신구 제거</div></div> <div></div>	<div><div>■ 시술 후 주의사항 교육</div><div>■ 맥박 확인(족부동맥)</div><div>■ 통증관리</div><div>■ 출혈여부 관찰</div></div>	<div><div>[퇴원교육]</div><div>-퇴원 후 주의사항 설명</div><div>-검사 및 외래 예약</div></div> <div></div>

※ 상기 일정은 환자 상태에 따라 변경될 수 있습니다.